

# 平成30年度 丹波篠山黒豆栽培履歴書

生産者氏名	
住 所	④
電話番号	079- -

ほ場No.1	ほ場No.2	ほ場No.3	
ほ場地番			
面積 (a)	アール	アール	
種子・苗	自家種子・JA種子・その他 ( )	自家種子・JA種子・その他 ( )	自家種子・JA種子・その他 ( )
栽培区分	直播・移植	直播・移植	直播・移植
作業	作業月日	作業月日 ( □ ほ場No. に同じ)	作業月日 ( □ ほ場No. に同じ)
耕起	/	/	/
畦立て	/	/	/
は種	/	/	/
定植	/	/	/
収穫	/	/	/

区分	肥料名	施肥基準量	作業月日	kg/10a	作業月日 ( □ ほ場No. に同じ)	kg/10a	作業月日 ( □ ほ場No. に同じ)	kg/10a
土づくり	完熟堆肥	2,000kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	アツミン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ハレー28号	200kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
元肥	有機石灰セルカ	60kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	パワーリン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	エムコート045 (黒豆いちばん)	45kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
追肥	丹波黒大豆スペシャル	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	PK化成40号	20kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	亜リン酸粒状1号	2kg/10a	/ /	kg	/ /	kg	/ /	kg
	ホスプラス	500倍	/ /	kg	/ /	kg	/ /	kg
	NK化成2号	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	適用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日	作業月日 ( □ ほ場No. に同じ)	作業月日 ( □ ほ場No. に同じ)			
殺虫剤	アドマイヤー1粒剤	3kg/10a	アブラムシ類	は種時	播満土壌混和	/	/	/			
		育苗トレイ (30x60cm) 1箱当り50g			育苗トレイの培土に均一に混和	/	どちらか1回	/	どちらか1回	/	どちらか1回
	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	ネキリムシ類	収穫30日前まで	土壌表面散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	カルホス粉剤	4kg/10a	ネキリムシ類	は種時または定植時	作業施用土壌混和	/ /	/ /	/ /			
	スミチオン乳剤	1,000倍	マメシクイガ・マメヒメサヤマシクイガ・カメムシ類・アブラムシ類	収穫21日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	サイアノックス乳剤	1,000倍	フキノメイガ・マメシクイガ	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	トレボン乳剤	1,000倍	カメムシ類・マメシクイガ・ハスモンヨトウ・アブラムシ類・アズキノメイガ	収穫14日前まで	散布	/ /	合わせて2回以内	/ /	合わせて2回以内		
	トレボン粉剤DL	4kg/10a	マメシクイガ・カメムシ類	収穫14日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	エルサン乳剤	1,000倍	ハスモンヨトウ・カメムシ類・アブラムシ類・マメシクイガ	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	アグロスリン乳剤	2,000倍	マメシクイガ・カメムシ類・フタスジヒメハムシ	収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	フレバノンフロアブルS	4,000倍	ハスモンヨトウ・マメシクイガ	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	ニッラン水和剤	2,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	ダニトロンフロアブル	1,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
コロマイト乳剤	1,500倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /				
殺虫殺菌剤	クルーザー MAXX	8ml/乾燥種子1kg	茎疫病・黒根腐病・紫斑病・アブラムシ類・タネバエ・ネキリムシ類	は種前	塗抹処理	/	/	/			
殺菌剤	ベルコート水和剤	5g/種子1kg	紫斑病	は種前	種子粉衣	/	合わせて4回以内 (種子粉衣は1回)	/	合わせて4回以内 (種子粉衣は1回)	/	合わせて4回以内 (種子粉衣は1回)
		1,000倍		収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	Zボルドー粉剤DL	3kg/10a	紫斑病・茎疫病	-	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	Zボルドー (水和剤)	500倍	紫斑病・葉焼病・斑点細菌病	-	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	ランマンフロアブル	1,000倍	茎疫病・べと病	収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
ライメイフロアブル	2,000倍	茎疫病・べと病	収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /				
除草剤	ラウンドアップマックスロード	500ml/10a	一年生雑草	耕起前又は出芽前まで	雑草茎葉散布	/ /	合わせて2回以内	/ /	合わせて2回以内	/ /	合わせて2回以内
				収穫前日まで	雑草茎葉散布 畦間処理	/ /	/ /	/ /	/ /		
	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	は種前	雑草茎葉散布	/ / / /	合わせて3回以内	/ / / /	合わせて3回以内	/ / / /	合わせて3回以内
				定植5日前まで	雑草茎葉散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /	/ / / /		
	刈草28日前まで	畦間処理	/ / / /	/ / / /	/ / / /	/ / / /					
クリアターン乳剤	700ml/10a	一年生雑草	は種直後 (雑草発生前)	全面土壌散布	/	どちらか1回	/	どちらか1回	/	どちらか1回	
トレファノサイド乳剤	300ml/10a	一年生雑草	定植前 (植穴堀前)	全面土壌散布	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回	
			は種後出芽前	畦間土壌散布	/						・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回
トレファノサイド粒剤2.5	6kg/10a	一年生雑草	定植前 (植穴堀前)	全面土壌散布	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)	
			は種後出芽前	畦間土壌散布	/						

栽培履歴確認者印 印

# 平成30年度 丹波篠山黒豆栽培履歴書

生産者氏名	
住 所	④
電話番号	079- -

ほ場No.4	ほ場No.5	ほ場No.6	
ほ場地番			
面積 (a)	アール	アール	
種子・苗	自家種子・JA種子・その他 ( )	自家種子・JA種子・その他 ( )	自家種子・JA種子・その他 ( )
栽培区分	直播・移植	直播・移植	直播・移植
作業	作業月日	作業月日 ( □ほ場No. と同じ)	作業月日 ( □ほ場No. と同じ)
耕起	/	/	/
畦立て	/	/	/
は種	/	/	/
定植	/	/	/
収穫	/	/	/

区分	肥料名	施肥基準量	作業月日	kg/10a	作業月日 ( □ほ場No. と同じ)	kg/10a	作業月日 ( □ほ場No. と同じ)	kg/10a
土づくり	完熟堆肥	2,000kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	アヅミン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ハレー28号	200kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
元肥	有機石灰セルカ	60kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	パワーリン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	エムコート045 (黒豆いちばん)	45kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
追肥	丹波黒大豆スペシャル	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	PK化成40号	20kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	亜リン酸粒状1号	2kg/10a	/ /	kg	/ /	kg	/ /	kg
	ホスプラス	500倍	/ /	kg	/ /	kg	/ /	kg
	NK化成2号	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	適用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日	作業月日 ( □ほ場No. と同じ)	作業月日 ( □ほ場No. と同じ)			
殺虫剤	アドマイヤー1粒剤	3kg/10a	アブラムシ類	は種時	播満土壌混和	/	/	/			
		育苗トレイ (30x60cm) 1箱当り50g			育苗トレイの培土に均一に混和	/	どちらか1回	/	どちらか1回	/	どちらか1回
	ダイアジノン粒剤5	6kg/10a	ネキリムシ類	収穫30日前まで	土壌表面散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	カルホス粉剤	4kg/10a	ネキリムシ類	は種時または定植時	作業施用土壌混和	/ /	/ /	/ /			
	スミチオン乳剤	1,000倍	マメシクイガ・マメヒメサヤマシガ・カメムシ類・アブラムシ類	収穫21日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	サイアノックス乳剤	1,000倍	フキノメイガ・マメシクイガ	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	トレボン乳剤	1,000倍	カメムシ類・マメシクイガ・ハスモンヨトウ・アブラムシ類・アズキノメイガ	収穫14日前まで	散布	/ /	合わせて2回以内	/ /	合わせて2回以内		
	トレボン粉剤DL	4kg/10a	マメシクイガ・カメムシ類	収穫14日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	エルサン乳剤	1,000倍	ハスモンヨトウ・カメムシ類・アブラムシ類・マメシクイガ	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	アグロスリン乳剤	2,000倍	マメシクイガ・カメムシ類・フタスジヒメハムシ	収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	フレバノンフロアブルS	4,000倍	ハスモンヨトウ・マメシクイガ	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	ニッラン水和剤	2,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
	ダニトロンフロアブル	1,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /			
コロマイト乳剤	1,500倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /				
殺虫殺菌剤	クルーザー MAXX	8ml/乾燥種子1kg	茎疫病・黒根腐病・紫斑病・アブラムシ類・タネバエ・ネキリムシ類	は種前	塗抹処理	/	/	/			
殺菌剤	ベルコート水和剤	5g/種子1kg	紫斑病	は種前	種子粉衣	/	合わせて4回以内 (種子粉衣は1回)	/	合わせて4回以内 (種子粉衣は1回)	/	合わせて4回以内 (種子粉衣は1回)
		1,000倍		収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	Zボルドー粉剤DL	3kg/10a	紫斑病・茎疫病	-	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	Zボルドー (水和剤)	500倍	紫斑病・葉焼病・斑点細菌病	-	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	ランマンフロアブル	1,000倍	茎疫病・べと病	収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
ライメイフロアブル	2,000倍	茎疫病・べと病	収穫7日前まで	散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /				
除草剤	ラウンドアップマックスロード	500ml/10a	一年生雑草	耕起又は出芽前まで	雑草茎葉散布	/ /	合わせて2回以内	/ /	合わせて2回以内	/ /	合わせて2回以内
				収穫前日まで	雑草茎葉散布 畦間処理	/ /	/ /	/ /	/ /		
	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	は種前	雑草茎葉散布	/ / / /	合わせて3回以内	/ / / /	合わせて3回以内	/ / / /	合わせて3回以内
				定植5日前まで	雑草茎葉散布	/ / / /	/ / / /	/ / / /			
	クリアターン乳剤	700ml/10a	一年生雑草	は種直後 (雑草発生前)	全面土壌散布	/	どちらか1回	/	どちらか1回	/	どちらか1回
				定植3日前まで (雑草発生前)	全面土壌散布	/	/	/	/		
トレファノサイド乳剤	300ml/10a	一年生雑草	定植前 (植穴堀前)	全面土壌散布	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回	/	・全面土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回	
			は種後出芽前	畦間土壌散布	/						/
トレファノサイド粒剤2.5	6kg/10a	一年生雑草	定植前 (植穴堀前)	全面土壌散布	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)	/	・畦間土壌散布として乳剤、粒剤のどちらか1回 (但し同一剤の2回施用は不可)	
			は種後出芽前	畦間土壌散布	/						/