

平成30年度 丹波篠山山の芋栽培履歴書

生産者氏名	ほ場No. 1			ほ場No. 2			ほ場No. 3			
住所	ほ場地番									
	面積 (a)	アール			アール			アール		
篠山市	作業	作業月日	作業月日 (□ほ場No. に同じ)			作業月日 (□ほ場No. に同じ)				
電話番号	耕起	/	/			/				
	畦立て	/	/			/				
	植付	/	/			/				
079- -	収穫	/	/			/				

区分	肥料名	施用量	作業月日	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a
土づくり	完熟堆肥	2,000kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	アツミン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	火カケイフン	300kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ミネカリンP-3	400kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	有機石灰セルカ	100kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	苦土石灰	100kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
元肥	ベレット山の芋配合	400kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ハイクラス	240kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	硫酸加里	20kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	スーパーエコロング413	220kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
追肥	NK化成2号	50kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	有機入り化成特A801	100kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	通用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	作業月日 (□ほ場No. に同じ)
殺虫剤	アドマイヤー1粒剤	4kg/10a	コガネムシ類	植付時	槽満土壌混和	/	/	/
	ガードベイドA	3kg/10a	ネキリムシ類	生育初期	株元散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	トレボン乳剤	1,000倍	アブラムシ類・ヤマノイモコガ	収穫14日前まで	散布	/ / /	/ / /	/ / /
	コロマイト乳剤	1,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /
	マイトコーネフロアブル	1,000倍	ハダニ類	収穫3日前まで	散布	/	/	/
	コテツフロアブル	2,000倍	カンザワハダニ・ナガイモコガ	収穫前日まで	散布	/ /	/ /	/ /
	プレバソンフロアブルS	2,000倍	ナガイモコガ・ハスモンヨトウ	収穫前日まで	散布	/ / /	/ / /	/ / /
	ネマトリンエース粒剤	20kg/10a	ネコブセンチュウ	植付前	全面土壌混和	/	/	/
	ダイアジノンSLソル	25倍	コガネムシ類幼虫	植付前	全面土壌混和	/	/	/
種子消毒剤	ベンレートT水和剤	100~200倍	青かび病・褐色腐敗病	植付前	10分間種いも浸漬	/	/	/
	ヘルコートフロアブル	200倍	青かび病	植付前	10分間種いも浸漬	/	種子消毒は1回	/
殺菌剤		1,000倍	炭そ病・葉炭病	収穫7日前まで	散布	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /
	ダコニール1000	1,000倍	炭そ病・葉炭病・つる枯病	収穫30日前まで	散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	ラビライト水和剤	400倍	炭そ病・葉炭病	収穫14日前まで	散布	/ / / / /	/ / / / /	/ / / / /
	ストロビーフロアブル	2,000倍	炭そ病	収穫7日前まで	散布	/ / /	/ / /	/ / /
	アミスター20フロアブル	2,000倍	炭そ病・葉炭病	収穫前日まで	散布	/ / /	/ / /	/ / /
除草剤	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	収穫30日前まで	雑草茎葉散布(植付前又は畦間処理)	/ / /	/ / /	/ / /
	ザクサ液剤	500ml/10a	一年生雑草	収穫30日前まで	雑草茎葉散布(萌芽前又は畦間処理)	/ / /	/ / /	/ / /
	ゴーソーサン乳剤30	400ml/10a	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布	/	/	/
	ロロックス(水和剤)	200g/10a	一年生雑草	植付直後	全面土壌散布	/ /	/ /	/ /
	ロロックス粒剤	6kg/10a	一年生雑草	収穫60日前まで	畦間土壌散布	/ /	/ /	/ /
その他	ラテミンリン化亜鉛1%	30~60g/10a	野ソ		1~2g(10~20粒)をそのまま、或いは、小袋詰をソ穴に投入	/ / / / / / / /	/ / / / / / / /	/ / / / / / / /
						/ / / / / / / /	/ / / / / / / /	/ / / / / / / /

栽培履歴確認者印 印

平成30年度 丹波篠山山の芋栽培履歴書

生産者氏名	ほ場No. 4			ほ場No. 5			ほ場No. 6			
〒	ほ場地番									
住所	面積 (a)	アール			アール			アール		
篠山市	作業	作業月日	作業月日 (□ほ場No. に同じ)			作業月日 (□ほ場No. に同じ)				
電話番号	耕起	/	/			/				
079-	畦立て	/	/			/				
-	植付	/	/			/				
	収穫	/	/			/				

区分	肥料名	施用量	作業月日	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a
土づくり	完熟堆肥	2,000kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	アツミン	40kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	火カケイフン	300kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ミネカリンP-3	400kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	有機石灰セルカ	100kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	苦土石灰	100kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
元肥	ベレット山の芋配合	400kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	ハイクラス	240kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	硫酸加里	20kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	スーパーエコロング413	220kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
追肥	NK化成2号	50kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
	有機入り化成特A801	100kg/10a	/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg
			/	kg	/	kg	/	kg

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	通用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	作業月日 (□ほ場No. に同じ)
殺虫剤	アドマイヤー1粒剤	4kg/10a	コガネムシ類	植付時	槽満土壌混和	/	/	/
	ガードベイドA	3kg/10a	ネキリムシ類	生育初期	株元散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	トレボン乳剤	1,000倍	アブラムシ類・ヤマノイモコガ	収穫14日前まで	散布	/ / /	/ / /	/ / /
	コロマイト乳剤	1,000倍	ハダニ類	収穫7日前まで	散布	/ /	/ /	/ /
	マイトコーネフロアブル	1,000倍	ハダニ類	収穫3日前まで	散布	/	/	/
	コテツフロアブル	2,000倍	カンザワハダニ・ナガイモコガ	収穫前日まで	散布	/ /	/ /	/ /
	プレバソンフロアブルS	2,000倍	ナガイモコガ・ハスモンヨトウ	収穫前日まで	散布	/ / /	/ / /	/ / /
	ネマトリンエース粒剤	20kg/10a	ネコブセンチュウ	植付前	全面土壌混和	/	/	/
	ダイアジノンSLソル	25倍	コガネムシ類幼虫	植付前	全面土壌混和	/	/	/
種子消毒剤	ベンレートT水和剤	100~200倍	青かび病・褐色腐敗病	植付前	10分間種いも浸漬	/	/	/
	ヘルコートフロアブル	200倍	青かび病	植付前	10分間種いも浸漬	/	種子消毒は1回	/
殺菌剤		1,000倍	炭そ病・葉炭病	収穫7日前まで	散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	ダコニール1000	1,000倍	炭そ病・葉炭病・つる枯病	収穫30日前まで	散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	ラビライト水和剤	400倍	炭そ病・葉炭病	収穫14日前まで	散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	ストロビーフロアブル	2,000倍	炭そ病	収穫7日前まで	散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
	アミスター20フロアブル	2,000倍	炭そ病・葉炭病	収穫前日まで	散布	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
除草剤	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	収穫30日前まで	雑草茎葉散布(植付前又は畦間処理)	/ / /	/ / /	/ / /
	ザクサ液剤	500ml/10a	一年生雑草	収穫30日前まで	雑草茎葉散布(萌芽前又は畦間処理)	/ / /	/ / /	/ / /
	ゴーソーサン乳剤30	400ml/10a	一年生雑草	植付後萌芽前(雑草発生前)	全面土壌散布	/	/	/
	ロロックス(水和剤)	200g/10a	一年生雑草	植付直後	全面土壌散布	/ /	/ /	/ /
	ロロックス粒剤	6kg/10a	一年生雑草	収穫60日前まで	畦間土壌散布	/ /	合わせて2回以内	/ /
その他	ラテミンリン化亜鉛1%	30~60g/10a	野ソ		1~2g(10~20粒)をそのまま、或いは小袋詰をソ穴に投入	/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
						/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
						/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /
						/ / / / / /	/ / / / / /	/ / / / / /