

平成30年度 丹波篠山栗栽培履歴書

生産者氏名	ほ場No. 1	ほ場No. 2	ほ場No. 3
④	ほ場地番		
住 所	面積 (a)	アール	アール
篠山市			
電話番号	品種	丹沢・筑波・銀寄・ぼろたん	丹沢・筑波・銀寄・ぼろたん
079-		その他 ()	その他 ()
-	収穫	/	/

施肥	肥料名	施用量 (10aあたり)				作業月日	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a
		2~3年生	4~6年生	7~10年生	10年生以上						
元肥	完熟堆肥	2t	2t	2t	2t	/	kg	/	kg	/	kg
	塩加燐安1号	20kg	10kg	20kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
	発酵鶏糞	-	30kg	50kg	100kg	/	kg	/	kg	/	kg
						/	kg	/	kg	/	kg
実肥	NK化成2号	-	10kg	15kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
						/	kg	/	kg	/	kg
礼肥	塩加燐安1号	-	10kg	20kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
	または燐硝安加里S604	-	10kg	20kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
						/	kg	/	kg	/	kg
					/	kg	/	kg	/	kg	
					/	kg	/	kg	/	kg	

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	適用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日					作業月日 (□ほ場No. に同じ)					作業月日 (□ほ場No. に同じ)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
殺虫剤	マシン油乳剤95	14倍	カイガラムシ類		芽の動き出す前に散布ムラのないように丁寧に散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	サッチューコートSセット	15倍	キクイムシ類	産卵時期(但し収穫90日前まで)	樹幹部及び主枝に散布または塗布	/					/					/				
	アディオソ乳剤	2,000倍	クリタマバチ	羽化脱出期(但し収穫14日前まで)	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	エルサン乳剤	1,000倍	クリイガアブラムシ、モモノゴマダラノメイガ	収穫14日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	アドマイヤー水和剤	1,000倍	クリイガアブラムシ	収穫7日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	フェニックスフロアブル	4,000倍	モモノゴマダラノメイガ	収穫前日まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
殺菌剤	ベンレート水和剤	2,000~3,000倍	実炭そ病	裂果前(但し収穫14日前まで)	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	ベルコートフロアブル	1,000倍	実炭そ病	収穫14日前まで	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
除草剤	ラウンドアップマックスロード	500ml/10a	一年生雑草	雑草生育期(収穫7日前まで)	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	収穫30日前まで(雑草生育期)	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

栽培履歴確認者印 印

平成30年度 丹波篠山栗栽培履歴書

生産者氏名	ほ場No. 4	ほ場No. 5	ほ場No. 6
④	ほ場地番		
住 所	面積 (a)	アール	アール
篠山市		アール	アール
電話番号	品種	丹沢・筑波・銀寄・ほるとん	丹沢・筑波・銀寄・ほるとん
079-		その他 ()	その他 ()
-	収穫	/	/

施肥	肥料名	施用量 (10aあたり)				作業月日	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a	作業月日 (□ほ場No. に同じ)	kg/10a
		2~3年生	4~6年生	7~10年生	10年生以上						
元肥	完熟堆肥	2t	2t	2t	2t	/	kg	/	kg	/	kg
	塩加燐安1号	20kg	10kg	20kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
	発酵鶏糞	-	30kg	50kg	100kg	/	kg	/	kg	/	kg
						/	kg	/	kg	/	kg
実肥	NK化成2号	-	10kg	15kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
						/	kg	/	kg	/	kg
礼肥	塩加燐安1号	-	10kg	20kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
	または燐硝安加里S604	-	10kg	20kg	20kg	/	kg	/	kg	/	kg
						/	kg	/	kg	/	kg
					/	kg	/	kg	/	kg	
					/	kg	/	kg	/	kg	
					/	kg	/	kg	/	kg	

区分	農薬名	希釈倍数・使用量	適用病害虫・雑草	使用時期	使用方法	作業月日					作業月日 (□ほ場No. に同じ)					作業月日 (□ほ場No. に同じ)				
						1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
殺虫剤	マシン油乳剤95	14倍	カイガラムシ類		芽の動き出す前に散布ムラのないように丁寧に散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	サッチューコートSセット	15倍	キクイムシ類	産卵時期 (但し収穫90日前まで)	樹幹部及び主枝に散布または塗布	/					/					/				
	アディオソ乳剤	2,000倍	クリタマバチ	羽化脱出期 (但し収穫14日前まで)	散布	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	エルサン乳剤	1,000倍	クイガアブラムシ、モモノゴマダラノメイガ	収穫14日前まで	散布	/	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	
	アドマイヤー水和剤	1,000倍	クイガアブラムシ	収穫7日前まで	散布	/	/	/			/	/	/			/	/	/		
	フェニックスフロアブル	4,000倍	モモノゴマダラノメイガ	収穫前日まで	散布	/	/				/	/				/	/			
							/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
殺菌剤	ベンレート水和剤	2,000~3,000倍	実炭そ病	裂果前 (但し収穫14日前まで)	散布	/	/	/	/		/	/	/	/		/	/	/	/	
	ベルコートフロアブル	1,000倍	実炭そ病	収穫14日前まで	散布	/	/				/	/				/	/			
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
除草剤	ラウンドアップマックスロード	500ml/10a	一年生雑草	雑草生育期 (収穫7日前まで)	散布	/	/	/			/	/	/			/	/	/		
	バスタ液剤	500ml/10a	一年生雑草	収穫30日前まで (雑草生育期)	散布	/	/	/			/	/	/			/	/	/		
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
						/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/